山羊抗小鼠IgG(H+L)（不交叉人IgG)

多重亲和纯化 • 高特异性 • 低交叉反应 科研专用 | 不与人IgG结合

产品名称

山羊抗小鼠IgG(H+L)（不交叉人IgG)

蛋白浓度

OD280吸光值一般为7，合蛋白浓度5 mg/mL，具体以标签标识为准

缓冲液成分

0.01M PBS、pH 7.2、N□□□□CMIT/MIT/THYMOL□

产品纯度

以抗体计不低于90%

制备方法

免疫原来自健康小鼠血清高纯度IgG（含IgG各亚类），多次免疫健康的雄性山羊，获得双扩散效价不低于1:32的抗血清，经多重特异亲和纯化，溶于缓冲液中。

特异性

不和人IgG、牛血清白蛋白（BSA）、酪蛋白发生结合。

有效期限

请您在管体注明有效期内使用。

推荐工作稀释比例

ELISA	1:20,000 - 1:100,000
ICC/IF	1:200 - 1:2,000
FLOW CYT	1:1,000 - 1:4,000
WESTERN BLOT	1:20,000 - 1:50,000

使用建议： 请根据实验体系在推荐范围内选择最佳稀释比例，也可在此建议范围之外根据实际情况合理使用。本产品也能很好地应用于胶体金以及其他常规体外免疫学实验。

推荐稀释液： 常规使用含0.2% BSA和0.05%吐温-20的0.01M PBS（pH 7.0~7.4）。

储存方法

建议避光存放在 **-20℃ （或-16℃及以下温度）**。避免反复冻融，分装保存可有效保持活性。

注意事项

虽然本产品很稳定，但您还是应避免过于反复融化。如果每次使用很少量，可以将本抗体适度分装，每次使用一管。如需长期4℃存放，请联系我们购买定制产品。如果防腐剂对实验有影响，可透析去除后使用，透析后不建议再长期保存。

本试剂仅用于科学研究，不能直接用于诊断。

仅供科研使用 分装保存，避免反复冻融 使用前请短暂离心 适用于ELISA / ICC / IF / Flow Cyt / WB / 胶体金等平台 不与人IgG交叉反应