# HRP-山羊抗人IgG(Fc特异性)(不交叉小鼠)多克隆抗体 • 辣根过氧化物酶标记

高酶活性 • 抗人IgG Fc特异性 • 不交叉小鼠 • 高亲和力 HRP conjugated Polyclonal Goat Anti-Human IgG (Fc specific) (Non cross with Mouse)

在您使用本产品前请认真阅读说明书，这对您顺利完成实验很有帮助。

产品名称

HRP-山羊抗人IgG(Fc特异性)(不交叉小鼠) / HRP-Polyclonal Goat Anti-Human IgG (Fc specific) (Non cross with Mouse)

标记物浓度

以抗体计 1 mg/mL 左右（以标记物计 2 mg/mL 左右）

缓冲液成分

50% □□、0.01M PBS、0.5% GSA、Proclin-300

特异性

不交叉小鼠IgG，特异性识别人IgG Fc片段

有效期限

请查看管体标签，请在管体注明有效期内使用

## 推荐工作稀释比例

ELISA

1:4,000 - 1:20,000

WESTERN BLOT

1:4,000 - 1:12,000

IHC

1:500 - 1:2,500

**使用建议：** 请根据实验体系在推荐范围内选择最佳稀释比例，也可根据具体情况在此范围之外合理使用。本产品性能优异，若使用得当可稀释至数万倍后仍具有使用价值。
**推荐稀释液：** 含 0.2% BSA 和 0.05% 吐温-20 的 0.01M PBS (pH 7.0)。也可使用其他正确的稀释液。原则上配成的工作液建议一次性使用完毕；若稀释后需长期存放或多次使用，请联系我们购买稳定剂或商品化稀释液。

## 储存方法

建议避光存放在 -20℃ ± 4℃。避免反复冻融，分装保存可有效保持活性。

## 注意事项

虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可使用，但还是强烈建议您在管体规定的有效期内正确使用。请不要在脏乱和强光环境中取用，以免造成污染和失效。如果一次使用很少可以将其适当分装后使用，这样可以有效防止试剂因为频繁使用而造成污染。
请使用正确的稀释液，没有酶免基础知识的人员不得利用本产品做任何实验，否则可能得到错误结果。
**本试剂仅用于科学研究，不能直接用于诊断。**

仅供科研使用 分装保存，避免反复冻融 使用前请短暂离心，避免甘油分层 适用于ELISA/WB/IHC及免疫检测平台